CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Samolepicí absorpční polyuretanový obvaz

CHARAKTERISTIKA
MEDISORB P PLUS ADHESIVE je sterilní, adhezivní pěnový obvaz, který se skládá z následujících součástí:
- hydrofilní polyuretanové pěna – jedná se o měkkou a pružnou vrstvu, která zodpovídá za udržení odpovídající vlhkosti v ráně. Má vysokou absorpční schopnost, pohlcuje tedy přebytečný exsudát, a to díky speciální struktuře „pore-in-pore",
- polypropylenová polyuretanová fólie – jedná se o vnější vrstvu chránící ránu před vlivy zvenčí,
- hypoalergenního akrylové lepidlo – adhezivní vrstva umožňuje upevnění obvazu na ránu,
- silikonizovaného papíru – vrstva zabezpečujúca lepidlo, s perforáciu, ktorá uľahčuje aplikáciu.

INDIKACE
Adhezivní obvaz MEDISORB P PLUS ADHESIVE je určen k léčbě exsudujících ran, jako jsou popáleniny, poproměnní rány, dekubitální vředy vzniklých u žil s insuficiencí, pooperační polytraumata, je vhodný také pro ošetřování proležanin. Obvaz se skvěle hodí i pro rychlé ošetření veškerých ran od nekrotické tkáně a hnisu.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte obväz na rany so suchou chrastou alebo čiernou nekrózou. Produkt nie je určený na použitie v kombinácii s metanolom, formalínom, dusitom alebo dezinfekčnými prostriedkami. Obväz nie je vhodný na použitie v telových dutinách. Obväz sa nesmie používať na poškodenie krvácania a ošetrovanie krvácajúcich tkanív.

SPÔSOB POUŽITIA
1. Rany umyte sterilným fyziologickým roztokom pro odstranění zbytků mastí nebo suché nekrotické tkáně.
2. Jemně osušte pokožku okolo rany.
3. Otevřete obal.
   Uchopte pružinové okraje vnitřního obalu (obal z metalizované fólie) a jemným tahem zcela odkryjte obvaz.
4. Ujistěte se, že obvaz bude umístěn na ráně správnou stranou!
   Obvaz MEDISORB P PLUS ADHESIVE má dvě strany:
   - hladký lesklý povrch, který má složit jako vnější vrstva a ochrana rány před vnějšími vlivy,
   - adhezivní povrch s hypoalergenním lepidlem, z ktorej treba odstrániť ochranný papier.
5. Přilnavá aplikace:
   Obvaz položte na dlaň tak, aby lesklý povrch chránící adhezivní povrch směřoval nahoru. Odtrhněte obvaz podél perforace. Lehce jej natáhněte, aby se silikonový papír oddělil od lepidla. Odtrhněte jeden z kusů krycího papíru, začněte vnitřním horním okrem. Poté položte obvaz na dlaň nelepicí stranou dolů a odstraňte druhý kryci papírek tak, že jej uchopíte za vnitřní horní roh. Nedotýkejte se lepicí plochy. Umístěte obvaz na ránu, adhezním povrchem dolů. V případě menších ran se obvaz přistřihnout na požadovanou velikost. Obvaz by měl překrýt celou plochu rány a vyhnout 2-3 cm širokými okraji kolem obvazu. Dávejte pozor, aby mezi exsudátu bolo obvázom priamo a úplne chránené.
6. Obväz sa musí denne kontrolovať.
   - v prípade, že na pod nim nazhromaždí nadbytok exsudátu, který dosáhne k okrajem alebo začne premokať, treba obväz vymeniť. Výmena obväzu by mala prebehnúť do 1-5 dní, v závislosti od morfológie lézie rany a množstva exsudátu;
   - v prípade ak sa objavia známky zápalového stavu (začervenanie, opuch, nadmerné zahrievanie okolo rany) sa obväz musí preložiť používať pokiaľ symptómy nezmizli. Povšimnutí zápalu sa môže poradiť lekár.
7. Po ukončení ošetření je vhodné obvaz zlikvidovat jako zvířecí antibiotických roztoků.
8. V případě mělkého množství exsudátu z rany, může obvaz vyschnout a přilnout k jej povrchu. V takovém případě může při převázce dojít k poranění, krvácání a bolestem. Aby k tomu nedocházelo treba obväz pred jeho odstránením zvlhčiť fyziologickým roztokom.

UPOZORNENIA
1. Adhezívny obväz MEDISORB P PLUS ADHESIVE je v ponuke v sterilnom stave.
2. Obväz nevyžaduje vopred nasýtenie sterilným fyziologickým roztokom.
3. Nadmerné natiahnutie obväzu môže spôsobiť jeho poškodenie.
4. Výrobok nelze opakovaně sterilizovat.
5. Výrobek je určen pouze na jednorazové použití. Opakované použití výrobku je nepřijatelné vzhledem k tomu, že ztrácí své absorpční a adhezivní vlastnosti. V případě opakovaného použití výrobku by mohlo dojít k přenosu patogenů.
6. Nepoužívajte obväz MEDISORB P PLUS ADHESIVE po uplynutí doby jeho použitelnosti.
7. Nepoužívajte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.
8. Obväz je nevšeľabiteľný a slouží výhradně pro vnější použití.
9. Doporučuje se aplikovat obväz hneď po otvorení obalu. Nepoužité časti obväzu je třeba jako již nepoužitelné bezpečně zlikvidovat.
10. Obväz by pomocheť na rámi max. 1-5 dní.
11. Obväz lze vasthnout sterilizovaným nůžkami tak, aby jeho velikost umožňovala zakrytí povrchu rany.
12. Apyrogenní výrobek.

PROCES STERILIZACE
Produkt se sterilizuje radiačně. Přímý obal musí být před použitím bez poškození. V případě poškození přímého obalu je třeba považovat zdravotnický prostředek za nesterilní a nepoužitelný.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladovací podmínky pro obvazy MEDISORB P PLUS ADHESIVE by měly splňovat následující požadavky:
- nevystavujte působení slunečního záření,
- uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C,
- rozsah vlhkosti 25-65%,
- uchovávejte za podmínek, kdy je zajištěna ochrana před vlhkostí a mechanickým poškozením nebo chemickým znečištěním,
- uchovávejte v originálním jednotlivém obalu (karton a přímý obal). Veškerá mechanická poškození obalu mohou způsobit ztrátu sterility výrobku.

MOŽNÉ KOMPLIKACE
Nežoj zjištěn výskyt žádných komplikací ani nežádoucích reakcí souvisejících s přímým užitím adhezivní vrstvy obvazu. Použití akrylové lepidlo je hypoalergenní. Nebyly zjištěny alergenní účinky obvazu, avšak je třeba dbát zvláštní pozornosti v případě jeho použití u osob s přecitlivělostí na akrylové lepidlo nebo polyuretanovou pěnu.
V případě nadměrného přínutí obvazu k ráně je třeba jej navlhčit sterilním fyziologickým roztokem a opatrně odstranit.

Dátum posledného ověření: 03.2020

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Samolepiaci savý polyuretanový obväz

VLASTNOSTI
MEDISORB P PLUS ADHESIVE je sterilný savý penový obväz, ktorý sa skladá z:
- hydrofilnej polyuretánovej peny – mäkkej pružnej vrstvy zabezpečujúcej udržanie adekvátnej vlhkosti rany. Má vysokú schopnosť absorbovať nadbytočné exsudáty vďaka špecifickej štruktúre „pore-in-pore",
- polypropylénovej polyuretánovej fólie – ochrannej vrstvy chrániaca ranu pred vonkajšími faktormi,
- hypoalergénneho akrylového lepidla – adhézna vrstva umožňuje upevnenie obväzu na ranu,
- silikonizovaného papiera – vrstva zabezpečujúca lepidlo, s perforáciou, ktorá uľahčuje aplikáciu.

INDIKÁCIE
Adhézny obväz MEDISORB P PLUS ADHESIVE je určený na liečenie rán s exsudátom, tj. popálenín, pooperačných rán, vredov predkladiska v dôsledku žilovej nedostatočnosti, pooperačných rozsiahlych poranení a preležanín. Obväz je tiež určený na rýchle ošetrenie rôznych typov rán z odumretého tkaniva a hnisavých sekrétov.

KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívajte obväz na rany so suchou chrastou alebo čiernou nekrózou. Produkt nie je určený na použitie v kombinácii s metanolom, formalínom, dusitom alebo dezinfekčnými prostriedkami. Obväz nie je vhodný na použitie v telových dutinách. Obväz sa nesmie používať na poškodenie krvácania a ošetrovanie krvácajúcich tkanív.

SPÔSOB POUŽITIA
1. Rany umyte sterilným fyziologickým roztokom, aby ste ju očistili od masti alebo suchých nekrotických tkanív.
2. Jemne osušte pokožku okolo rany.
3. Otvorte obal.
   Uchopte pružinové okraje vnútorného obalu (obal z metalizovanej fólie) a potiahnite, až do úplného odkrytia obväzu.
4. Uistite sa, že obväz bude umiestnený na ráne správnou stranou!
   Obväz MEDISORB P PLUS ADHESIVE má dve strany:
   - hladký lesklý povrch, ktorý má slúžiť ako vnútorná vrstva a ochrana rany pred vonkajšími vplyvmi,
   - adhézny povrch s hypoalergénnym lepidlom, z ktorej treba odstrániť ochranný papier.
5. Priama aplikácia:
   Obväz položte na dlaň tak, aby lesklý povrch chránici adhezní povrch smerovali nahor. Zahnite obväz pozdĺž perforácie. Jemne napínajte do chvíle pokiaľ sa silikónový papier neodlupne od lepidla. Odtrhnite jeden papier zaťahujú vnútorným horným rohom. Potom položte obväz nelepiacou stranou na dlaň a odstráňte druhý ochranný papier ťahaním za jeho vnútorný horný roh. Nedotýkajte sa lepiacej plochy. Umiestnite obväz na ranu, adhezním povrchem dolů. V prípade menších ran sa obväz môže zastrihnúť na rozmer umožňujúci úplné zakrytie rany s prídavnými 2-3 cm za fou. V prípade väčších rán sa môže použiť viacší počet obväzov. Dávajte pozor, aby miesto exsudátu bolo obvázom priamo a úplne chránené.
6. Obväz sa musí denne kontrolovať.
   - v prípade, že na pod nim nazhromaždí nadbytok exsudátu, ktorý dosiahne k okrajom alebo začne premokať, treba obväz vymeniť. Výmena obväzu by mala prebehnúť do 1-5 dní, v závislosti od morfológie lézie rany a množstva exsudátu;
   - v prípade ak sa objavia známky zápalového stavu (začervenanie, opuch, nadmerné zahrievanie okolo rany) sa obväz musí preložiť používať pokiaľ symptómy nezmizli. Povšimnutí zápalu sa môže poradiť lekár.
7. Po ukončení ošetrenia je vhodné obväz zlikvidovať antibiotických roztokom.
8. V prípade mierneho množstva exsudátu z rany, môže obväz vyschnúť a priľnúť k jej povrchu. V takomto prípade môže pri preváza prísť k poraneniu, krvácaniu a bolestiam. Aby k tomu nedochádzalo treba obväz pred jeho odstránením zvlhčiť fyziologickým roztokom.

UPOZORNENIA
1. Adhézny obväz MEDISORB P PLUS ADHESIVE je v ponuke v sterilnom stave.
2. Obväz nevyžaduje vopred nasýtenie sterilným fyziologickým roztokom.
3. Nadmerné natiahnutie obväzu môže spôsobiť jeho poškodenie.
4. Výrobok nesmie byť znovu sterilizovaný.
5. Výrobok je určený na jednorazové použitie. Opakované použitie výrobku je z dôvodu straty jeho absorpčných vlastností a priľnavosti neprípustné. Opätovné použitie výrobku môže viesť k prenosu patogénov.
6. Nepoužívajte obväz MEDISORB P PLUS ADHESIVE po obdobi exspirácie.
7. Nepoužívajte v prípade ak je obal otvorený alebo poškodený.
8. Obväz je nesorpčný, určený výlučne na vonkajšie použitie.
9. Odporúčame obväz aplikovať hneď po otvorení obalu. Nepoužité časti obväzu, ktorý sa nepoužil treba bezpečne zlikvidovať.
10. Obväz môže byť na rane aplikovaný max. 1-5 dní.
11. Obväz môže byť pristrihovaný sterilnými nožnicami na veľkosť umožňujúcu zakrytie povrchu rany.
12. Výrobok je nepyrogénny.

PROCES STERILIZÁCIE
Produkt sa sterilizuje rádiošk. Primý obal musí byť pred použitím bez poškodení. V prípade poškodení primého obalu je třeba považovať zdravotnický prostředek za nesterilní a nepoužitelný.

PODMIENKY SKLADOVANIA
Skladovanie obväzov MEDISORB P PLUS ADHESIVE musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu,
- skladovať v teplote sa 15 °C do 35 °C,
- rozsah vlhkosti 25-65%,
- skladovať v podmienkach, ktoré chránia pred zvlhnutím, mechanickým alebo chemickým znečistením,
- skladovať v originálnom jednotlivom obale (karton a vnútorný obal). Akékoľvek mechanické poškodenie obalu môže spôsobiť stratu sterility výrobku.

MOŽNÉ KOMPLIKÁCIE
Neboť zistený výskyt žiadnych komplikácií alebo nežiaducich účinkov spojených s priamym používaním adhéznej vrstvy obväzu. Použitá akrylová lepidlo je hypoalergénne. Neboli zistené alergénne účinky obväzu, ale v prípade jeho použitia u osôb, ktoré sú precitlivené na akrylové lepidlo alebo polyuretánovú penu je potrebná mimoriadna opatrnosť.
V prípade nadmerného prítlaku obväzu k rane je treba ju navlhčiť sterilným fyziologickým roztokom a opatrne odstrániť.

Dátum posledného overenia: 03.2020

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Autoadeziv, pansament absorbant din poliuretan

CARACTERISTICI
MEDISORB P PLUS ADHESIVE este un pansament steril, din spumă adezivă compus din:
- spumă poliuretanică hidrofilă – un strat moale, elastic, responsabil pentru menținerea umidității corespunzătoare a unei răni. Are o capacitate de absorbție de exsudat ridicată, datorită structurii speciale de "por-în-por"("pore-in-pore"),
- o peliculă din poliuretan semipermeabilă – un strat exterior ce protejează plaga de factori externi,
- un adeziv acrilic hipoalergenic – un strat de adeziv ce asigură fixarea pansamentului pe plagă,
- hârtie siliconată – un strat adeziv de protejare perforat pentru o aplicație mai ușoară.

INDICAȚII
Pansamentul adeziv MEDISORB P PLUS ADHESIVE este destinat pentru tratamentul plăgilor ce exsudează și anume răni post-operatorii, ulcerații cutanate secundare insuficienței venoase, leziuni post-traumatice extinse și pentru escare. Pansamentul este recomandat de asemenea pentru curățarea rapidă a țesutului necrozat și a exudatelor purulente de la toate tipurile de plăgi.

CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați pansamentul pentru plăgi cu o crustă uscată sau necroză neagră. Produsul nu este destinat utilizării în combinație cu unguente, creme, pudră sau dezinfectanți. Pansamentul nu este destinat utilizării în cavitățile corpului. Pansamentul nu trebuie utilizat pentru controlul sângerării sau pentru rănile care sângerează.

MODUL DE UTILIZARE
1. Spălați rana cu ser fiziologic steril normal pentru a elimina orice unguente sau țesutul necrozat uscat.
2. Uscați delicat pielea din jurul plăgii.
3. Deschideți pachetul.
   Trageți de marginile opuse ale ambalajului individual (fabricat din peliculă metalizată) și îndepărtați cu atenție o extremă completă pansamentul.
4. Asigurați-vă că pansamentul este corect orientat cu stratul absorbant îndreptat spre plagă!
   Pansamentul MEDISORB P PLUS ADHESIVE are două suprafețe:
   - o suprafață netedă și lucioasă întenționată a fi o suprafață externă de protecție,
   - o suprafață adezivă acoperită cu adeziv acrilic hipoalergenic, protejat cu o peliculă de hârtie, ce urmează a fi eliminată înainte de aplicarea pansamentului.
5. Aplicare:
   Așezați pansamentul pe palma mâinii, cu partea ce protejează suprafața absorbantă orientată în sus. Îndoiți pansamentul de-a lungul zonei perforate. Despărțiți ușor hârtia silicionată de pe partea adezivă. Înlăturați una din bucățile de hârtie, pornind de la colțul de sus din interior. Apoi, așezați pansamentul în palma mâinii, cu partea adezivă în exterior și îndepărtați al doilea strat protector, trăgând de colțul de sus din interior. Nu atingeți suprafața adezivă. Așezați pansamentul pe rană, cu suprafața adezivă orientată spre plagă. Pentru răni mai mici, puteți tăia pansamentul astfel încât să acopere bine plaga, lăsând 2-3 cm în afara zonei afectate. Pentru răni mai mari, puteți folosi mai multe pansamente. Asigurați-vă că pansamentul acoperă direct și complet rana.
6. Pansamentul trebuie verificat zilnic:
   - în caz de exudat acumulat în exces sub pansament, atunci când exudatul atinge marginile acestuia sau începe să se scurgă, pansamentul trebuie schimbat. Schimbarea pansamentului trebuie să aibă loc în termen de 1-5 zile - în funcție de morfologia plăgii și a cantității de exudat;
   - în cazul unor semne de inflamație (înroșire, edem, căldură excesivă în zona din jur) întreruptă utilizarea pansamentului și până când simptomele dispar. Tratamentul poate fi continuat după eliminarea inflamației.
7. După ce tratamentul, înainte de aplicare, pansamentul poate fi împărțit în soluție cu ambidice.
8. În cazul unei cantități mici de exudat, pansamentul se poate usca și se poate lipi de suprafața rănii. În acest caz, schimbarea pansamentului poate fi asociată cu leziuni, sângerări și dureri. Pentru a evita toate acestea, pansamentul ar trebui umezit înainte cu ser fiziologic normal.

NOTE
1. Pansamentul adeziv MEDISORB P PLUS ADHESIVE este oferit STERIL.
2. Pansamentul nu are nevoie de umezire cu ser fiziologic steril normal.
3. Întinderea excesivă a pansamentului poate cauza deteriorarea acestuia.
4. Produsul nu trebuie să fie re-sterilizat.
5. Produsul este de unică folosință. Refolosirea este inadmisibilă din cauza pierderii proprietăților absorbante și adezive.
6. Sterilizarea produsului poate duce la transmiterea de agenți patogeni.
7. Nu utilizați pansamentul MEDISORB P PLUS ADHESIVE după data de expirare.
8. Nu folosiți dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
9. Pansamentul nu este resorbabil și este destinat numai pentru uz extern.
10. Se recomandă aplicarea pansamentului imediat după deschiderea pachetului. Părțile de pansament neutilizate nu sunt adecvate pentru utilizare și ar trebui să fie aruncate în conformitate cu regulile locale.
11. Pansamentul nu ar trebui să rămână pe plagă mai mult de 1-5 zile.
12. Pansamentele pot fi tăiate cu foarfecă sterilă la o dimensiune care permite acoperirea completă a suprafeței plăgii.
13. Produsul este apirogen.

PROCESUL DE STERILIZARE
Produsul este sterilizat cu radiații. Pachetul direct Întreține să fie intact înainte de utilizare. În cazul în care ambalajul primar este deteriorat, dispozitivul medical ar trebui considerat nesteril și produsul nu poate fi utilizare.

CONDIȚII DE PĂSTRARE
Pansamentele MEDISORB P PLUS ADHESIVE ar trebui să fie stocate în următoarele condiții:
- nu expuneți la lumina solară,
- păstrați la temperaturi între 15° C și 35° C,
- interval de umiditate 25-65%,
- stocați în condiții care să asigure protecția împotriva umezirii și a leziunilor mecanice sau chimice,
- păstrați în ambalajul original individual (cutie de carton sau ambalaj interior). Orice daune mecanice ale pachetului pot reprezenta un risc în ceea ce privește sterilitatea.

POSIBILE COMPLICAȚII
Nu au fost raportate complicații sau reacții adverse asociate cu efectul direct al stratului adeziv al pansamentului. Adezivul acrilic utilizat în pansament este hipoalergenic. Nu au fost raportate reacții de hipersensibilitate la pansament, deși ar trebui acordată o atenție deosebită atunci când se aplică pansamentul la oameni hipersensibili la adezivi acrilic sau la spumă poliuretanică.
În cazul în care pansamentul este excesiv de lipit de rană, pansamentul ar trebui să fie umezit cu ser fiziologic steril normal și apoi îndepărtat cu grijă.

Ultima verificare: 03.2020

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Lipnus absorbuojantis poliuretano tvarstis

SAVYBĖS
MEDISORB P PLUS ADHESIVE yra sterilus, lipnus putų tvarstis, į kurio sudėtį jeina:
- hidrofilinės poliuretano putos – tai švelnus, elastingas sluoksnis, kuris užtikrina tinkamą drėgmės žaizdos dirėgmę. Dėka savo ypatingos „poros-poroje" struktūros jis įsiurbia gausų sluoginį gausų eksudatą (išskyras),
- pusiau pralaidi poliuretano folija – tai išorinis sluoksnis, apsaugantis žaizdą nuo išorės poveikio,
- hipoalerginiu akrilo klijai – tai lipus sluoksnis, kurio dėka tvarstis prigludna prie zaizdos,
- silikonizotas popierius – tai lipnus apsauginis sluoksnis perforuotas tam, kad palengvintų tvarsčio užklijavimą.

INDIKACIJOS
Lipnus tvarstis MEDISORB P PLUS ADHESIVE yra skirtas eksudacinių (išspiaujančių) žaizdų gydymui, būtent: pooperacinių žaizdų, blauzdų opų, atsiradusių dėl venų nepakankamumo, didelių plotų sužeidimų, nušalimų, ir pragulų gydymui. Šis tvarstis taip pat puikiai gali būti pritaikytas ir panaudotas skubiai pašalinus nekrozinius audinius ir visų tipų žaizdų, kuriems būdingos pūlingos išskyros, gydymui.

KONTRAINDIKACIJOS
Naudokitės tvarsčiu žaizdoms su susidariusiu sausu šašu ar juodu nekrozinių audinių gydyti. Produkto negalima naudoti kartu su jokiais kitais tepalais, kremais, miltelais ar dezinfekciniais priemonėmis. Produktas yra netinkamas naudoti kūno ertmėse. Tvarsčio negalima naudoti kraujavimui stabdyti ar dėti jo ant kraujuojančių žaizdų.

NUODYMAI NAUDOJIMUI
1. Nuplaukite žaizdą sterilia normalaus druskingumo tirpalu ir taip pašalinkite bet kokius odos tepalo likučius ar sudžiūvusį nekrozinį audinį.
2. Švelniai nusausinkite odą, supančią žaizdą.
3. Atidarykite pakuotę.
   Laikydami vienų pakuotę už jos priešingų kraštų (pagamintų iš metalizuotos plėvelės) traukite kol tvarstis visiškai bus atidengtas.
4. Įsitikinkite, kad tvarstis yra atgręžtas teisingai: jo sugeriantis sluoksnis turi būti atsuktas į žaizdą!
   MEDISORB P PLUS ADHESIVE tvarstis turi du paviršius:
   - glotnų ir blizgų paviršių, turintį apsaugoti nuo išorinio poveikio,
   - lipnų paviršių, padengtą hipoalerginiais akrilo klijais, apsaugota popierine juostele, kurią reikia pašalinti prieš dedant tvarstį ant žaizdos.
5. Tiesiog užklijuokite:
   Padėkite tvarstį ant savo delno taip, kad lapelis, saugantys lipnų paviršių, būtų viršuje. Išlenkite tvarstį išilgai perforuotos zonos. Švelniai patempkite, kad silikoninis popierius atsiskirtų nuo lipnaus paviršiaus. Nuplėškite vieną apsaugojo popieriaus lapelį, pradedant plėšti nuo vidinio viršutinio jo kampo. Dabar padėkite tvarstį ant delno taip, kad tvarsčio lipni pusė būtų viršuje, ir nuimkite antrą apsaugantį lapelį, traukdami už vidinio viršutinio jo kampo. Nelieskite lipnaus paviršiaus. Uždėkite tvarstį ant žaizdos taip, kad jo lipnus paviršius būtų nukreiptas žemyn, į žaizdą. Jei reikia sutvarstyti mažesnę žaizdą, galite iškirpti reikiamą tvarsčio formą. Tvarstis turi padengti visą žaizdos plotą ir dar 2-3 cm aplink žaizdos kraštus. Jeigu reikia sutvarstyti didelės žaizdas, galite naudoti daugiau, nei vieną tvarstį. Įsitikinkite, kad šlapiuojantis plotas yra tinkamai ir visiškai uždengtas tvarsčiu.
6. Uždėtą tvarstį reikia tikrinti kasdien:
   - jeigu po tvarsčiu prisirinkia pernelyg daug išskyrų, tvarstį reikia pakeisti. Tvarsčius reikia keisti ne rečiau, nei kas 1-5 dienas, atsižvelgiant į žaizdos pobūdį ir eksudato kiekį;
   - jeigu atsirandą uždegimo požymių (odos paraudimas, susidaro edema ar pernelyg sutyksta žaizdos plotas), tuomet naudotis tvarsčiu reikia nutraukti, kol simptomai dings. Kai uždegimą pašalinsite, galėsite gydymą tęsti toliau.
7. Jei būtina, prieš naudojimą tvarstį galit būti dirmintas antibiotikų tirpale.
8. Jeigu eksudato išsiskiria labai mažai, tvarstis gali prilipti prie žaizdos paviršiaus. Tokiu atveju, keičiant tvarstį, galima sužeisti odą, gali prasidėti kraujavimas ar atsirasti skausmas. Tam, kad to išvengtumėte, prieš nuimdami tvarstį, pirmiausia sudrėkinkite jį normaliuo druskingumo tirpalu.

PASTABOS
1. MEDISORB P PLUS ADHESIVE tvarstis yra parduodamas sterilus.
2. Prieš naudojimą tvarsčio nereikia sudrėkinti sterilu normaliaus druskingumo tirpalu.
3. Pernelyg didelis tvarsčio tempimas gali pažeisti tvarstį.
4. Intindeva excesivă a pansamentului poate cauza deteriorarea acestuia.
5. Produktą nuo trebuie să fie re-sterilizat.
6. Produktas skirtas vienkartiniam naudojimui. Pakartotinai naudoti neleidžiama, nes tvarsčio pranašumai yra sugeriamiejasi ir lipnieji savybės. Pakartotinai naudojant produktą, galima pernešti ligų sukėlėjus.
7. Nenaudokite MEDISORB P PLUS ADHESIVE tvarsčio, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui.
8. Nenaudokite produto, jeigu jo pakuotė yra atidaryta arba pažeista.
9. Tvarstis ne absorbuojamas ir skirtas tik išoriniam naudojimui.
10. Rekomenduojame tvarstį užklijuoti iškart po to, kai atidarysite pakuotę. Nepanaudotas tvarsčio dalys yra netinkamos naudoti ir turi būti saugiai sunaikintos.
11. Tvarstį galima laikyti ant žaizdos ne ilgiau, nei 1-5 dienas.
12. Sterilizuotas. Žirklėmis tvarsčius galima apkirpti iki tokio dydžio, kad būtų pilnai uždengtas žaizdos paviršius.
13. Produktas yra apirogenins.

STERILIZAVIMO PROCESAS
Produktas yra sterilizuojamas spinduliuote. Preki naudojimą tiesiogiai su produktu kontaktuojanti pakuotė turi būti nepažeista. Jeigu vidinė pakuotė yra apgadinta, medicininė priemonė laikoma ne sterilia ir netinka naudojimui.

LAIKYMO SĄLYGOS
MEDISORB P PLUS ADHESIVE tvarsčiai turi būti laikomi:
- saulės spindulių nepasiekiamose vietose,
- nuo 15°C iki 35°C temperatūroje,
- palaikoma, kurį drėgnumas nuo 25 iki 65%,
- sąlygomis, garantuojančiomis produkto apsaugą nuo sudrėkimo, mechaninio pažeidimų ar cheminio užteršimo,
- originaliose atskirose pakuotėse (kartoninėse dėžėse ir tiesiogiai su produktu kontaktuojančiuose pakuotėje). Bet koks mechanins pakuotės pažeidimas gali pakenkti produkto sterilumui.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS
Nėra žinoma apie jokias komplikacijas ar nepageidaujamą poveikį, kurį tiesiogiai būtų sukėlęs tvarstio lipnusis sluoksnis. Akrilo klijai, naudojami tvarstyje, yra hipoalerginiai. Nėra žinoma apie padidėjusio jautrumo reakcijas, sukeltas tvarsčio, tačiau reikalų imtis specialių atsargumo priemonių, naudojant tvarstį įgyjant žmonėms, kurienės būdingas padidėjęs jautrumas akrilo klijams ar poliuretano putoms.
Jeigu tvarstis pernelyg stiprai prilimpa prie žaizdos, reikia jį sudrėkinti sterilu normaliaus druskingumo tirpalu ir kruopščiai pašalinti.

Paskutinį kartą redaguota: 03.2020

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Pašlīmējošs uzsūcošs poliuretāna pārsējs

RAKSTUROJUMS
MEDISORB P PLUS ADHESIVE ir sterils, pašlīmējošs pītves pārsējs, kas sastāv no:
- hidrofilas poliuretāna pītves – mīksts, elastīgs slānis, kas uztur brūcē nepieciešamo mitrumu un nodrošina augsto eksudāta uzsūkšanās, ko nodrošina „pore-in-pore" īpašā struktūra,
- gaisu caurlaidīgas poliuretāna plēve – ārējais slānis, kas pasargā brūci no ārējo faktoru iedarbības,
- hipoalerģiska akrila līmi – līmes slānis, kas palīdz piestiprināt brūcei,
- papīrs ar silikona pārklājumu – slānis, kas aizsargā līmes slāni, ar iegrieztumu, kas atvieglo plēvītes uzlīmēšanu.

DARBĪBA
MEDISORB P PLUS ADHESIVE pārsēju izmanto eksudējošu brūču, apdegumu brūču, pēcoperācijas brūču, kāju čūlas veicoša nepiekļautības gadījumā, plašā postraumatiskai ievainojumi, kā arī izgulējumu ārstēšanai. Pārsējs piemērots arī brūču attīrīšanai no atmirušiem audiem un strutām.

KONTRINDIKĀCIJAS
Pārsēja pielietošana nav pieļaujama, ja uz brūces ir kreveles vai melnā nekroze. Pārsēju nedrīkst izmantot savienojumā ar krēmiem, zīdeļēm, pūderiem vai dezinfekcijas līdzekļiem. Pārsēju nedrīkst izmantot uz asiņojošas brūces un asinošanas aptumšanai.

LIETOŠANAS VEIDS
1. Attīrīt brūci ar sterilu fizioloģisko šķīdumu no ziedes vai sausās nekrozes cone.
2. Uzmanīgu nosusināt ādu ap brūci.
3. Atvērt aploksnīnu, satverot pretējās malas (iepakojums ir no metāliskas plēves) un pavilkt līdz iepakojums pilnīgi atveras.
4. Pārliecinieties, ka pārsējs tiks uzlikts uz brūces ar pareizo pusi!
   Pārsējam MEDISORB P PLUS ADHESIVE ir divas virsmas:
   - gludā virsma ar spīdumu, kas pasargā brūci no ārējas vides faktoru ietekmes,
   - pašlīmējošas sānās ar hipoalerģisku akrila līmi, no kuras nepieciešams noņemt aizsargājošo papīru.
5. Tieša uzklāšana:
   Pārsēju jānovieto plauktā tā, lai papīra lapas, kas aizsargā adhezīvo virsmu, būtu vērstas uz augšu. Pārsēja līsekloa gar perforācijas līniju. Nedaudz jāsastiepj, lai silikona papīrs atsāļtos no līmes. Jāatdala viena papīra lapa, sākot no sākšā augšējā stūrīša. Pēc tam pārsēju jāuzliek ar adhezīvo pusi uz leju. Nepieskarieties līmējošajai virsmai. Pārsēju uzmanība tam, lai eksudāta šeišās ražanās viete būtu pilnīgi pieseguse ar pārsēju.
6. Pārsēju nepieciešams katru dienu kontrolēt:
   - gadījumos, kad zem pārsēja sakrājas liela eksudāta, kad eksudāts saniestej pārsēja malas vai sāk teciēt, pārsēju nepieciešams nomainīt. Nomainīt pārsēju nepieciešams 1-5 dienu laikā, kas atkarīgs no brūces morfoloģijas un eksudāta daudzuma;
   - gadījumos, kad novēro iekaisuma procesu (apsārtums, audzēj, paaugstināta temperatūra brūces apvidū) jāpārtrauc pārsēja lietošana līdz iekaisuma procesa simptomu izzušanai. Pārsēja lietošanu var turpināt pēc iekaisuma novēršanas.
7. Pēc ārstēšanas pabeigšanas pārsēju ieteicams likvidēt kā zīdītāju antibiotiku šķīdumu.
8. Ja eksudāta daudzums ir neliels, pārsējs var pielipt pie brūces. Šādos gadījumos, nomainot pārsēju, tas var radīt sāpes, audu bojājumus vai asinošanu. Pirms pārsēja noņemšanas pārsēju ieteicams samitrināt ar fizioloģisko šķīdumu.

UZMANĪBU
1. Pašlīmējošais pārsējs MEDISORB P PLUS ADHESIVE pieejams sterilā veidā.
2. Pārsēju pirms lietošanas nevajag samitrināt ar sterilu fizioloģisko šķīdumu.
3. Pārmērīga pārsēja izstiepšana var izraisīt tā bojājumus.
4. Pārsēju nedrīkst sterilizēt atkārtoti.
5. Pārsēju atkārtoti lietot nedrīkst, jo tas zaudē savas absorbcijas un palīmējošās spējas.
6. Pārsēju MEDISORB P PLUS ADHESIVE nedrīkst lietot ja beidzies tā lietošanas derīguma termiņš.
7. Nedrīkst lietot, ja iepakojums bijis atvērts vai bojāts.
8. Pārsējs neuzsūcas un ir paredzēts tikai ārējā.
9. Pēc iepakojuma atvēršanas ieteicams lietot pēc iespējas ātrāk. Pārsēja nederīgā sterilizēt atkārtoti.
10. Pārsēju var lietot atstradies uz brūces 1-5 dienas.
11. Pārsēju drīkst piegriezt ar sterilām šķērēm vajadzīgajā izmērā.
12. Pārsējs ir nepirogēns.

STERILIZĀCIJAS PROCESS
Pārsējs ir sterilizēts, izmantojot radiācijas metodi. Individuālais iepakojums nedrīkst būt bojāts. Ja individuālais iepakojums ir bojāts, medicīniskais izstrādājums skaitās nesterils un to nedrīkst izmantot.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
Pārsēja MEDISORB P PLUS ADHESIVE uzglabāšanas noteikumiem jāatbilst šādām prasībām:
- nepakļaut saules staru iedarbībai,
- glabāt ir 15 °C līdz 35 °C,
- mitruma diapazons 25-65%,
- glabāt sausā vietā, pasargāt no mehāniskas un ķīmiskas ietekmes un piesārņojuma,
- glabāt oriģinālajā individuālajā iepakojumā (kārbiņa un tiešais iepakojums). Katrs mehānisks bojājums var novest pie tā, ka izstrādājums kļūst nesterils.

IESPĒJAMIE SARĒĢĢUMI
Nav reģistrētas blakusparādības, kā arī nevēlamas reakcijas, kas saistības ar pārsēja līmes slāņa bieži ietekmi. Akrila līme tiek uzskatīta par hipoalerģisku. Nav novērotas alerģiskas reakcijas lietojot pārsēju, bet vienlaikus ieteicot piesardzību izmantojot pārsēju cilvēkiem ar paaugstinātu jutību uz akrila līmi, vai poliuretāna pīvi.
Ja pārsējs ir pielipis brūcei, tad pārsēju ieteicams samitrināt ar fizioloģisko šķīdumu un uzmanīgi noņemt.

Pēdējais pārskatīšanas datums: 03.2020

UA

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Самоклеювальна поглинаюча поліуретанова пов'язка

ХАРАКТЕРИСТИКА
MEDISORB P PLUS ADHESIVE це стерильна, самоклеювальна пов'язка із піни, що складається з:
- гідрофільної поліуретанової піни – це м'який, еластичний шар, який підтримує відповідне зволоження ран. Має високі поглинаючі властивості абсорбувати надлишку ексудату завдяки спеціальній структурі «pore-in-pore»,
- напівпроникної поліуретанової плівки – це зовнішній шар, який захищає рану від зовнішніх впливів,
- гіпоалергенного акрилового клею – клейкий шар, завдяки якому є можливим наклеїти пов'язку на рану,
- паперу з силіконовим покриттям – шар, що захищає клейкий шар, має перфорацію, яка полегшує накладення пов'язки.

ПОКАЗАННЯ
Самоклеюча пов'язка MEDISORB P PLUS ADHESIVE призначена для лікування ран з ексудатом, тобто післяопераційних ран, післяопераційних ран, вкритих гнилою або фібринозною некротичною тканиною, а також для перевязки пролежнів. Пов'язку також рекомендовано застосовувати для швидкого лікування різного виду ран від некрози і гнійних виділ

EN

INSTRUCTIONS FOR USE
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Self-adhesive, absorbent polyurethane dressing

CHARACTERISTICS
MEDISORB P PLUS ADHESIVE is a sterile, adhesive foam dressing composed of:
- hydrophilic polyurethane foam – a soft, elastic layer responsible for maintenance of appropriate humidity of a wound. It has a high exudate absorption capacity, due to the special "pore-in-pore" structure.
- a semi-permeable polyurethane foil – an external layer protecting the wound from external factors.
- a hypoallergenic acrylic adhesive – an adhesive layer ensuring fixation of the dressing to the wound.
- siliconised paper – an adhesive-protecting layer, perforated for easier application.

INDICATIONS
The adhesive dressing MEDISORB P PLUS ADHESIVE is intended for treatment of exudating wounds, namely post-operative wounds, skin ulcerations of various origin, to venous insufficiency, extensive post-traumatic injuries, and for bedsores. The dressing should be also perfectly applicable for rapid clearing of necrotic tissue and purulent exudates from all kinds of wounds.

CONTRAINDICATIONS
Do not use the dressing to wounds with a dry crust or black necrosis. The product is not intended for use in combination with ointments, creams, powder or disinfectants. The dressing is not intended for use in body cavities. The dressing should not be used for bleeding control or to bleeding wounds.

DIRECTIONS FOR USE
1. Wash the wound with sterile normal saline solution, to remove any ointments or dried necrotic tissue.
2. Delicately dry the skin surrounding the wound.
3. Open the pack.
   - Hold opposite edges of the individual package (made of metallised film) and pull to expose the dressing completely.
4. Make sure the dressing is correctly oriented with absorbing layer directed towards the wound!
   The MEDISORB P PLUS ADHESIVE dressing has two surfaces:
   - a smooth and glossy surface intended as an external, protective surface,
   - an adhesive surface coated with hypoallergenic acrylic adhesive, protected with a paper film that has to be removed before applying the dressing.
5. Direct application:
   Place the dressing on the palm of your hand, with the pieces protecting the adhesive surface facing upwards. Bend the dressing along the perforated area. Slightly pull it until the adhesive paper is detached from the adhesive. Remove one of the pieces of paper, starting from the inner top corner. Now place the dressing on the palm of your hand with the non-adhesive part facing the surface of the palm, and remove the second protective piece by pulling its inner top corner. Do not touch the adhesive surface. Place the dressing on the wound, with the adhesive surface facing downwards, towards the wound. For smaller wounds, you can cut the dressing so that the whole wound is covered, with 2-3 cm of the dressing left outside the wound area. For larger wounds, you can use more than one dressing. Make sure that the effusion area is covered by the dressing directly and fully.
6. The dressing should be checked on daily basis:
   - in case of excess exudate accumulated under the dressing, when the exudate reaches its edges or starts to leak, the dressing should be changed. The dressing change should take place within 1-5 days - depending on morphology of the wound bed and amount of exudate;
   - in case of signs of inflammation (reddening, oedema, excessive warmth of the wound area) discontinue the use of the dressing until the symptoms disappear. The treatment may be continued after the elimination of inflammation.
7. If necessary, before application the dressing may be soaked with antibiotic solution.
8. In case of low amount of exudate the dressing may dry out and stick to the wound surface. In that case, changing the dressing may be associated with injury, bleeding and pain. To avoid it, the dressing should be first humidified with normal saline solution.

NOTES
1. The adhesive dressing MEDISORB P PLUS ADHESIVE is offered STERILE.
2. The dressing does not require priming with sterile normal saline solution.
3. Excessive stretching of the dressing may cause its damage.
4. The product must not be re-sterilised.
5. The product is single use only. Reuse is impossible because of loss of absorptive and adhesive properties. Transmission of pathogens may result from reuse of the product.
6. Do not use the dressing MEDISORB P PLUS ADHESIVE after expiry date.
7. Do not use if the package is opened or damaged.
8. The dressing in not resorbable and intended for external use only.
9. It is recommended that the dressing is applied directly after opening of the package. Unused dressing parts are not suitable for use and should be safely discarded.
10. The dressing should remain on the wound for no longer than 5 days.
11. Dressings may be trimmed with sterile scissors to the size allowing complete coverage of the wound surface.
12. The product is apyrogenic.

STERILISATION PROCESS
The product is sterilised with radiation. The direct package has to be intact before use. In case the immediate packaging is damaged, the medical device should be considered as non-sterile and unsuitable for use.

STORAGE CONDITIONS
MEDISORB P PLUS ADHESIVE dressings should be stored in the following conditions:
- do not expose to sunlight,
- store at temperatures between 15°C and 35°C,
- humidity range 25-65%,
- store in conditions ensuring protection from wetting and mechanical or chemical damage,
- store in the original individual package (carton box or immediate packaging). Any mechanical damage of the package may pose a risk of non-sterility.

POSSIBLE COMPLICATIONS
No complications or adverse reactions associated with the direct effect of the adhesive layer of the dressing were reported. The acrylic adhesive used in the dressing is hypoallergenic. No hypersensitivity reactions to the dressing were reported, although special care should be taken when applying the dressing in people hypersensitive to acrylic adhesive or polyurethane foam.
In case of excessive sticking of the dressing to the wound, the dressing should be soaked with sterile normal saline solution and carefully removed.

Last verified in: 03.2020

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Selbstklebender absorbierender Polyurethan-Verband

CHARAKTERISTIK
MEDISORB P PLUS ADHESIVE ist ein steriler, selbstklebender Schaumverband mit folgenden Bestandteilen:
- hydrophiler Polyurethanschaum – weiche, elastische Schicht, die für die Erhaltung entsprechender Wundfeuchtigkeit verantwortlich ist. Verfügt über hohes Aufnahmefähigkeit des übermäßigen Exsudats durch die spezielle „pore-in-pore"-Struktur.
- halbdurchlässige Polyurethanfolie – Außenschicht zum Schutz der Wunde vor Außenfaktoren.
- hypoallergener Acrylkleber – Klebstoffschicht zur Fixierung auf der Wunde.
- Silikonpapier – Sicherungsschicht des Klebers mit Perforation zur Erleichterung der Applikation.

INDIKATIONEN
Der selbstklebende Verband MEDISORB P PLUS ADHESIVE ist für die Behandlung exsudativer Wunden, ch. Verbrennungswunden, Operationswunden, Unterschenkelgeschwüren als Folge der Veneninsuffizienz, ausgedehnte Unfallwunden, sowie für die Behandlung von Dekubitalgeschwüren vorgesehen. Der Verband ist an die schnelle Reinigung verschiedener Wunden von nekrotischem Gewebe und eitrigem Sekret perfekt geeignet.

KONTRAINDIKATIONEN
Den Verband nicht auf Wunden mit trockenem Schorf oder schwarzer Nekrose gebrauchen. Das Produkt ist nicht für die Anwendung in Verbindung mit Salben, Cremes, Puder oder Desinfektionsmitteln vorgesehen. Der Verband eignet sich nicht für Körperhöhlen. Den Verband nicht zur Stillung von Blutungen oder Behandlung von Blutwunden nutzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Die Wunde mit steriler isotonischer Kochsalzlösung zwecks ihrer Reinigung von der Salbe oder dem trockenen nekrotischen Gewebe waschen.
2. Die Haut um die Wunde herum sanft trocknen.
3. Die Verpackung öffnen.
   Nach den gekennzeichneten Kanten der Primärverpackung (Verpackung aus metallisierter Folie) greifen und ziehen, bis der Verband vollständig aufgedeckt ist.
4. Sicherstellen, dass der Verband auf der Wunde mit entsprechender Fläche angebracht wird!
   Der Verband MEDISORB P PLUS ADHESIVE hat zwei Flächen:
   - glatte glänzende Oberfläche, die als Außenschicht anzuwenden ist und vor Außenfaktoren schützt,
   - selbstklebende Oberfläche mit hypoallergenem Acrylkleber, von der das Sicherungspapier zu entfernen ist.
5. Direkte Applikation:
   Den Verband auf die Hand so legen, damit die Sicherungslappen mit der Adhäsionsfläche nach oben gerichtet sind. Den Verband entlang der Perforation biegen. Leicht so lange zuziehen, bis sich das Silikonpapier vom Kleber entschichtet. Ein Papier beginnend von der oberen Innenecke streifen. Dann mit der nichtklebenden Seite auf die Hand aufsetzen und das zweite Schutzpapier durch das Ziehen an der oberen Innenecke entfernen. Die Klebefläche nicht berühren. Den Verband auf die Wunde mit der nach unten gerichteten Adhäsionsfläche – in Richtung der Wunde platzieren. Bei kleineren Wunden kann der Verband bis zur Größe, die die ganze Behandlung der Wunde mit dem Überschuss von 2-3 cm außerhalb der Wunde ermöglicht, zugeschnitten werden. Bei größeren Wunden wird die Anwendung mehrerer Verbände zugelassen. Berücksichtigen, dass die Exsudatstelle direkt und komplett mit dem Verband gesichert wird.
6. Den Verband täglich kontrollieren und:
   - bei Ansammlung des übermäßigen Sekrets unter dem Verband und falls das Sekret bis zum Verbandrand gelangt oder durchzusickern beginnt, soll der Verband gewechselt werden. Der Verbandwechsel hat innerhalb von 1-5 Tagen, abgängig von der Morphologie der Wundbasis und Exsudatmenge, zu erfolgen;
   - bei Entstehung von Anzeichen des Entzündungszustands (Rötung, Schwellung, übermäßige Erwärmung der Wundumgebung) soll die Anwendung des Verbandes abgebrochen werden, bis die Symptome verschwinden. Die Behandlung kann durch erneut angebrachten Verband fortgesetzt werden.
7. Bedarfsweise kann der Verband vor dessen Applikation mit der Antibiotikalösung getränkt werden.
8. Bei kleineren Mengen des Wundsekrets kann der Verband austrocknen und an die Oberfläche anhaften. Beim Verbandwechsel können in diesem Fall Verletzungen, Blutungen und Schmerzen entstehen. Um dies zu vermeiden, ist der Verband vor dessen Entfernung mit der isotonischen Kochsalzlösung zu befeuchten.

BEMERKUNGEN
1. Der selbstklebende Verband MEDISORB P PLUS ADHESIVE wird im STERILEN Zustand angeboten.
2. Der Verband bedarf keiner vorherigen Befeuchtung mit der isotonischen Kochsalzlösung.
3. Übermäßige Dehnung des Verbandes kann ihn beschädigen.
4. Das Produkt kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
5. Einwegprodukt. Eine Wiederverwendung ist im Hinblick auf den Verlust der Saug- und Haftungseigenschaften nicht möglich. Bei Wiederverwendung des Produkts kann es zu Übertragung pathogener Faktoren kommen.
6. Den Verband MEDISORB P PLUS ADHESIVE nach Ablauf der Haltbarkeit nicht anwenden.
7. Nicht anwenden, falls die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
8. Der Verband ist nicht resorbierbar und dient ausschließlich zur äußeren Anwendung.
9. Empfohlen wird, dass der Verband direkt nach Öffnung der Verpackung appliziert wird. Nichtgenutzte Verbandteile als nicht wiederverwendbar vorsichtig entsorgen.
10. Den Verband auf die Wunde max. 1-5 Tage anwenden.
11. Die Verbände können mit steriler Schere bis zur Größe, die die Abdeckung der Wundoberfläche ermöglicht, zugeschnitten werden.
12. Pyrogenfreies Produkt.

STERILISIERUNG
Das Produkt wird im Verfahren der Strahlungssterilisierung sterilisiert. Die Primärverpackung hat vor der Anwendung unbeschädigt zu sein. Bei Beschädigung der Primärverpackung ist das medizinische Produkt als unsteril und nicht wiederverwendbar zu behandeln.

AUFBEWAHRUNG
Die Aufbewahrungsbedingungen der Verbände MEDISORB P PLUS ADHESIVE haben folgende Anforderungen zu erfüllen:
- nicht dem Sonnelicht aussetzen,
- in der Temperatur von 15 °C bis 35 °C aufbewahren,
- Luftfeuchtigkeit zwischen 25-65%,
- in Bedingungen, die vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung oder chemischen Einflüssen schützen, aufzubewahren,
- in originaler Einzelverpackung (Karton oder Primärverpackung) ausbewahren. Sämtliche mechanische Beschädigungen können beim Produkt den Verlust der Sterilität verursachen.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Es wurden keine Komplikation oder Nebenwirkungen im Zusammenhang mit direkter Wirkung der Klebeoffschicht des Verbands festgestellt. Der angewandte Acrylkleber ist hypoallergen. Es wurde keine reizende Wirkung des Verbands beobachtet, jedoch ist bei dessen Anwendung im Fall von Personen mit Überempfindlichkeit gegen Acrylkleber oder Polyurethanschaum besondere Achtung zu bewahren.
Bei übermäßiger Anhaftung des Verbands an die Wunde diesen mit steriler isotonischer Kochsalzlösung befeuchten und vorsichtig entfernen.

Datum der letzten Verifizierung: 03.2020

FR

MODE D'EMPLOI
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Pansement absorbant auto-adhésif en polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES
MEDISORB P PLUS ADHESIVE est un pansement de mousse adhésif, stérile, composé de :
- une mousse de polyuréthane hydrophile – c'est une couche élastique douce responsable du maintien de l'humidité appropriée de la plaie. Elle a une grande capacité à absorber les exsudats excédentaires grâce à sa structure particulière «pore-in-pore».
- un film de polyuréthane semi-perméable – c'est une couche externe qui protège la plaie de facteurs externes.
- un adhésif acrylique hypoallergénique – une couche adhésive permettant de fixer le pansement sur la plaie ;
- du papier siliconé – la couche qui protège l'adhésif, présentant une perforation afin de faciliter l'application.

INDICATIONS
Le pansement adhésif MEDISORB P PLUS ADHESIVE est conçu pour le traitement des plaies suintantes, à savoir des plaies après brûlures, des plaies post-opératoires, des ulcères de jambe comme conséquences de l'insuffisance veineuse, des blessures importantes post-traumatiques, ainsi que pour le traitement des escarres. Le pansement doit également être excellent pour une purification rapide de toutes sortes de plaies de tissus nécrotiques et sécrétions purulentes.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser le pansement sur la plaie avec une croûte sèche ou une nécrose noire. Le produit n'est pas conçu pour être utilisé en combinaison avec des pommades, crèmes, de la poudre ou des désinfectants. Le pansement n'est pas adapté pour être utilisé dans des cavités du corps. Le pansement ne doit pas être utilisé pour contrôler des hémorragies et panser les plaies saignantes.

MODE D'EMPLOI
1. Laver la plaie à une solution physiologique saline stérile pour éliminer les restes de la pommade ou des tissus nécrotiques secs.
2. Sécher délicatement la peau autour de la plaie.
3. Ouvrir l'emballage.
   Il faut saisir les bords opposés de l'emballage individuel (l'emballage en film métallisé) et tirer jusqu'à dégager totalement le pansement.
4. S'assurer que le pansement sera placé sur la plaie avec sa surface appropriée !
   Le pansement MEDISORB P PLUS ADHESIVE a deux faces :
   - la surface lisse brillante, qui doit être située en tant que surface extérieure, en protégeant la plaie des facteurs externes,
   - la surface adhésive avec un adhésif acrylique hypoallergénique, dont il faut enlever le papier protecteur.
5. L'application directe :
   Placez le pansement sur la main de sorte que les feuilles protégeant la partie adhésive soient orientées vers le haut. Pliez le pansement le long de la perforation. Tirez légèrement jusqu'à ce que le papier siliconé se détache de la colle. Retirez un papier en commençant par l'angle intérieur supérieur. Ensuite, placez le côté non adhésif du pansement sur la main et retirez le deuxième papier protecteur en tirant l'angle supérieur intérieur. Ne pas toucher la partie adhésive. Placez la partie adhésive du pansement sur la plaie. En cas de plaies plus petites, le pansement peut être coupé à une taille qui permet de couvrir complètement la plaie tout en laissant une tolérance de 2-3 cm à l'extérieur. En cas de plaies plus grandes on peut utiliser plusieurs pansements. Assurez-vous que l'exsudat soit complètement et entièrement protégée par le pansement.
6. Le pansement doit être contrôlé quotidiennement :
   - dans le cas d'accumulation de l'excès d'exsudat sous le pansement, lorsque la sécrétion atteint le bord ou commence à fuir, le pansement doit être changé. Le changement du pansement doit se faire au cours de 1-5 jours, en fonction de la morphologie du lit de la plaie et de la quantité d'exsudat ;
   - dans le cas où des caractéristiques de l'inflammation se présentent (la rougeur, le gonflement, le rechauffement excessif de la zone de la plaie), il faut cesser d'utiliser le pansement jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Une fois l'inflammation disparue, le traitement peut être poursuivi.
7. Si nécessaire, avant application le pansement peut être imbibé d'une solution antibiotique.
8. Dans le cas d'une petite quantité de sécrétion de la plaie, le pansement peut sécher et adhérer à sa surface. Alors, pendant le changement du pansement peuvent se présenter des blessures, des saignements et la douleur. Afin de les éviter, avant d'enlever le pansement, il faut l'humidifier avec une solution physiologique saline.

REMARQUES
1. Le pansement adhésif MEDISORB P PLUS ADHESIVE est disponible en état stérile.
2. Il ne nécessite pas d'être préalablement imprégné par une solution physiologique saline stérile.
3. Éviter une excessive du pansement peut l'endommager.
4. Le produit ne peut pas être restérilisé.
5. Le produit n'est destiné qu'à un usage unique. La réutilisation du produit est impossible à cause de la perte de ses propriétés absorbantes et adhésives. La réutilisation du produit peut provoquer la transmission d'agents pathogènes.
6. Ne pas utiliser le pansement MEDISORB P PLUS ADHESIVE au-delà de la date de péremption.
7. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
8. Le pansement est non resorbable et ne sert qu'à usage externe.
9. Il est recommandé que le pansement soit appliqué immédiatement après ouverture de l'emballage. Les parties non utilisées du pansement, comme impropres à l'usage, doivent être éliminées en toute sécurité.
10. Utiliser le pansement sur la plaie au max. 1-5 jours.
11. Les pansements peuvent être coupés avec des ciseaux stérilisés à la taille permettant de couvrir la surface de la plaie.
12. Produit apyrogène.

PROCESSUS DE STÉRILISATION
Le produit est stérilisé par le procédé de stérilisation par irradiation. L'emballage individuel doit être en bon état avant de l'utiliser. Si l'emballage individuel est endommagé, le produit médical doit être traité comme non stérile et impropre à l'utilisation.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Les conditions de stockage des pansements MEDISORB P PLUS ADHESIVE doivent répondre aux exigences suivantes :
- ne pas exposer au rayonnement solaire,
- stocker dans les températures de 15 °C à 35 °C,
- la plage d'humidité de 25-65 %,
- stocker dans des conditions qui protègent contre l'eau et les dommages mécaniques ou chimiques,
- stocker dans l'emballage individuel d'origine (carton et emballage direct). Tout endommagement mécanique de l'emballage peut exposer le produit à la perte de la stérilité.

COMPLICATIONS POSSIBLES
Aucune complications ou effets indésirables liés à l'action directe de la couche adhésive du pansement n'ont été constatés. L'adhésif acrylique utilisé est hypoallergénique. Aucuns effets sensibilisants du pansement n'ont été constatés, cependant, il faut être particulièrement prudent lors de son utilisation chez les personnes hypersensibles à l'adhésif acrylique ou à la mousse de polyuréthane.
Si le pansement adhère trop à la plaie, il faut l'imprégner avec une solution physiologique saline stérile et l'enlever avec précaution.

Date de la dernière vérification : 03.2020

NL

INFORMATIE VOOR GEBRUIK
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Zelfklevend, absorberend polyurethaan wondverband

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
MEDISORB P PLUS ADHESIVE is een steriel schuimverband, bestaande uit:
- hydrofiel polyurethaanschuim – een zachte, veerkrachtige laag die zorgt voor een optimaal vochtig wondmilieu, met een hoog absorberend vermogen door de speciale poriënstructuur ("pore-in-pore").
- semipermeabele polyurethaan film – een toplaag die de wond beschermt tegen externe factoren
- hypoallergene acrylijm – een kleeflaag voor fixatie van het verband op de wond
- gesiliconiseerd papier – geperforeerde beschermstrook op de kleeflaag

INDICATIES
MEDISORB P PLUS ADHESIVE wondverband is geschikt voor de behandeling van exsuderende wonden, zoals postoperatieve wonden, ulcus cruris t.g.v. veneuze insufficiëntie, uitgebreide traumatische wonden en doorliggwonden. Het wondverband kan tevens worden gebruikt voor een snelle reiniging van verschillende soorten wonden met necrotisch weefsel en pusafscheiding.

CONTRA-INDICATIES
Het wondverband niet toepassen op wonden met een droge korst of zwarte necrose. Het product is niet bedoeld voor gebruik in combinatie met zalf, crème, poeder of desinfectiemiddelen. Het wondverband is niet toegepast op wonden in lichaamsholten. Het wondverband is niet bedoeld voor bloedende wonden of om bloedingen te stelpen.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Reinig de wond met een steriele fysiologische zoutoplossing om eventuele resten van zalven of droog necrotisch weefsel te verwijderen.
2. Droog voorzichtig de huid rondom de wond.
3. Open de verpakking.
   Trek aan de tegenoverliggende randen van de individuele verpakking (van gemetalliseerde folie) en haal het wondverband volledig tevoorschijn.
4. Zorg ervoor dat het wondverband correct wordt aangebracht, met de absorberende laag op de wond.
   MEDISORB P PLUS ADHESIVE wondverband heeft twee oppervlakken:
   - een gladde, glanzende buitenzijde die bescherming biedt tegen externe factoren
   - een kleefzijde, gecoat met hypoallergene acrylijm en afgedekt met een papieren beschermstrook die moet worden verwijderd voor gebruik
5. Directe toepassing:
   Neem het wondverband in de hand, met de beschermstroken van de adhesiezijde naar boven gericht. Vouw het wondverband langs de perforatie. Trek zachtjes totdat het siliconenpapier loskomt van de adhesiezijde. Scheur één van de beschermstroken los vanaf de binnenste bovenhoek. Neem vervolgens het wondverband in de hand met de niet-klevende zijde naar de handpalm gericht en verwijder de tweede beschermstrook vanaf de bovenhoek. Raak de adhesiezijde niet aan. Plaats het verband op de wond, met de adhesiezijde naar het wondoppervlak gericht. In geval van kleine wonden kan het verband op maat worden geknipt. Het verband dient het wondgebied volledig te bedekken en de zone rondom de wond te overlappen met 2 tot 3 cm. In geval van grote wonden kunnen meerdere wondverbanden worden aangebracht. Zorg ervoor dat het gebied van exsudate direct en volledig wordt bedekt.
6. Controleer het wondverband dagelijks.
   - Verwissel het wondverband wanneer een grote hoeveelheid exsudaat zich ophoopt onder het verband, wanneer het exsudaat de randen van het verband heeft bereikt of begint door te lekken. Verbandverwisseling moet plaatsvinden binnen 1-5 dagen, afhankelijk van de status van het wondbed en de hoeveelheid exsudaat.
   - Staak het gebruik van het wondverband als er symptomen van een infectie worden waargenomen (zoals roodheid, zwelling, erg warme huid rond het wondgebied). De behandeling kan worden voortgezet als de infectie is verdwenen.
7. Indien nodig kan het wondverband voor gebruik worden bevochtigd met een antibiotische oplossing.
8. Het verband kan gaan uitdrogen en kleven aan het wondoppervlak bij een wond met weinig exsudaat. Verbandwisseling kan dan pijnlijk zijn en een bloeding en letsel veroorzaken. Om dit te vermijden dient het verband voor verwijdering te worden bevochtigd met een steriele fysiologische zoutoplossing.

OPMERKINGEN
1. MEDISORB P PLUS ADHESIVE wondverband wordt steriel aangeboden.
2. Het wondverband hoeft niet worden voorbereid met een steriele fysiologische zoutoplossing.
3. Overmatig uitrekken kan het verband beschadigen.
4. Het product niet opnieuw steriliseren.
5. Het product is bedoeld voor eenmalig gebruik. Hergebruik is niet mogelijk vanwege verlies van absorptie- en kleefvermogen. Hergebruik kan ook leiden tot overdracht van pathogenen.
6. MEDISORB P PLUS ADHESIVE niet gebruiken als de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden.
7. Het product niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is.
8. Het wondverband is niet resorbeerbaar en alleen geschikt voor uitwendig gebruik.
9. Het is raadzaam het verband onmiddellijk na opening van de verpakking toe te passen. Ongebruikte delen van het verband kunnen niet meer worden gebruikt en moeten veilig worden weggegooid.
10. Het wondverband maximaal 1-5 dagen op de wond laten.
11. Het wondverband kan met een steriele schaar op de juiste maat worden geknipt, zodat het gehele wondgebied wordt bedekt.
12. Het product is niet-pyrogeen.

STERILISATIE PROCES
Sterilisatie wordt uitgevoerd door middel van bestraling. De individuele verpakking moet voor gebruik intact zijn. Indien deze verpakking is beschadigd moet het medische hulpmiddel worden beschouwd als niet steriel en ongeschikt voor gebruik.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN
MEDISORB P PLUS ADHESIVE wondverband moet worden opgeslagen onder de volgende voorwaarden:
- buiten bereik van direct zonlicht,
- bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C,
- bij een luchtvochtigheid tussen 25% en 65%,
- buiten bereik van vocht, mechanische beschadiging of chemische verontreiniging,
- in de originele individuele verpakking (doos en directe verpakking). Mechanische schade aan de verpakking kan verlies van sterliteit tot gevolg hebben.

MOGELIJKE COMPLICATIES
Voor zover bekend zijn er geen complicaties of ongewenste bijwerkingen wat betreft de directe werking van de kleeflaag van het wondverband. De acrylijm is hypoallergeen. Hoewel er geen meldingen zijn van overgevoeligheidsreacties op het wondverband, dient men toch extra voorzichtig te zijn met toepassing van het verband bij mensen die overgevoelig zijn voor acrylijm of polyurethaanschuim. Mocht het wondverband sterk kleven aan het wondoppervlak, dan moet het eerst worden doordrenkt met een steriele fysiologische zoutoplossing en daarna voorzichtig worden verwijderd.

Laatst bijgewerkt: 03.2020

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Auto-adesivo, penso de espuma absorvente

CARACTERÍSTICAS
ADESIVO MEDISORB P PLUS ADHESIVE é um penso de espuma adesivo, estéril, composto por:
- Espuma hidrofílica de poliuretano – Uma película macia e elástica responsável por manter a humidade adequada de uma ferida. Elevada capacidade de absorção do exsudado, devido à sua estrutura especial porosa.
- Película de poliuretano semi-permeável – uma película externa que protege a ferida de factores externos.
- Adesivo acrílico hipoalergénico – película adesiva que garante a fixação do penso à ferida.
- Papel siliconizado – película protectora adesiva, perfurada para facilitar a sua aplicação.

INDICAÇÕES
O penso adesivo MEDISORB P PLUS ADHESIVE destina-se ao tratamento de feridas exsudativas, nomeadamente feridas pós-operatórias, ulceração da canela secundárias à insuficiência venosa, lesões extensas pós-traumáticas e escaras. O penso pode ser aplicado para limpeza rápida do tecido necrótico e exsudados purulentos de todos os tipos de feridas.

CONTRA INDICAÇÕES
Não use o penso para feridas com crosta seca ou necrose preta. O produto não deve ser utilizado em combinação com cremes hidratantes ou gordos, pó ou desinfectantes. O penso não se destina a ser utilizado em cavidades corporais. O penso não deve ser usado para o controle de sangramento ou ferimentos sangrentos.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Lave a ferida com solução salina normal estéril, para remover qualquer pomada ou tecido necrótico seco.
2. Secar delicadamente a pele ao redor da ferida.
3. Abra a embalagem.
   Segure as extremidades opostas da embalagem individual (de película metalizada) e puxe para expor o penso completamente.
4. Certifique-se de que o penso esteja orientado corretamente com a película absorvente direcionada para a ferida.
   O penso MEDISORB P PLUS ADHESIVE tem duas superfícies:
   - uma superfície lisa e brilhante destinada a ser uma superfície externa de protecção,
   - uma superfície adesiva revestida com adesivo acrílico hipoalergénico, protegida por uma película de papel que tem de ser removida antes de se aplicar o penso.
5. Aplicação directa:
   Coloque o penso na palma da sua mão, com as partes que protegem a superfície adesiva voltada para cima. Dobre o penso ao longo da área perfurada. Puxe-o ligeiramente até que o papel de silicone seja removido do adesivo. Raspe um dos pedaços de papel, começando pelo canto superior interno. Agora, coloque o penso na palma da sua mão com a parte não adesiva voltada para a superfície da palma e remova a segunda peça de protecção puxando seu canto superior interno. Não toque na superfície adesiva. Coloque o penso na ferida, com a superfície adesiva voltada para baixo, em direção à ferida. Para feridas menores, pode cortar o penso para que toda a ferida seja coberta, com 2-3 cm do penso deixado fora da área da ferida. Para feridas maiores, você pode usar mais do que um penso. Certifique-se de que a área de efusão é coberta pelo penso diretamente e completamente.
6. O penso deve ser verificado diariamente:
   - em caso de excesso de exsudado acumulado sob o penso, isto é, quando o exsudado atinge as bordas do penso ou começar a vazar, o penso deve ser substituído. A mudança de penso deve ser feita dentro de 1-5 dias - dependendo da morfologia da ferida e da quantidade de exsudação.
   - se houver sinais de inflamação (rubor, edema ou calor excessivo da área da ferida) interromper o uso do penso até que os sintomas desapareçam. O tratamento pode ser continuado após a eliminação da inflamação.
7. Se necessário, antes da aplicação o penso pode ser embebido com solução antibiótico.
8. No caso de uma ferida pouco exsudativa, o penso pode secar e tocar na superfície da ferida. Nesse caso, a mudança do penso pode estar associada a lesões, hemorragias e dor. Para evitar esta situação, o penso deve ser primeiro humidificado com solução salina estéril.

NOTAS
1. O penso MEDISORB P PLUS ADHESIVE é estéril.
2. O penso não necessita de preparação com solução salina normal estéril.
3. Esticar em excesso o penso pode causar danos.
4. O produto não deve ser re-esterilizado.
5. O produto é de uso único. Não deve ser reutilizado devido à perda de propriedades absorventes e adesivas. A transmissão de agentes patogénicos pode resultar da reutilização do produto.
6. Não use o penso MEDISORB P PLUS ADHESIVE depois de expirar a data de validade.
7. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
8. O penso não é reabsorvível e é destinado apenas para uso externo.
9. Recomenda-se que o penso seja aplicado logo após a abertura da embalagem. As partes do penso que não são utilizadas, não são adequadas para utilização e devem ser descartadas com segurança.
10. Use o penso por um máximo de 5 dias.
11. Os pensos podem ser cortados com tesouras esterilizadas do tamanho ideal à cobertura completa da superfície da ferida.
12. O produto é apirogénico.

PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
O produto é esterilizado com radiação. A embalagem tem de estar intacta antes de uso. Caso a embalagem esteja danificada, o dispositivo médico deve ser considerado não-esterilizado e inadequado para uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Penso MEDISORB P PLUS ADHESIVE deve ser armazenado seguindo as seguintes condições:
- Não deve ser exposto à luz solar,
- Armazenado a temperaturas entre os 15ºC e os 35ºC,
- Intervalo de humidade de 25-65%,
- Armazenar em condições que garantam proteção da, e danos mecânicos ou químicos,
- Armazenar na embalagem individual original (caixa de cartão ou embalagem direta). Qualquer dano mecânico na embalagem pode representar um risco de não esterilização.

COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS
Não foram relatadas complicações ou reações adversas associadas ao efeito direto da camada adesiva do penso. O adesivo acrílico usado no penso é hipoalergénico. Não foram notificadas reações de hipersensibilidade ao penso, embora se deva ter especial cuidado ao aplicar o penso em pessoas hipersensíveis ao adesivo acrílico ou à espuma de poliuretano.
Em caso de adesão excessiva do penso à ferida, o penso deve ser embebido com solução salina normal esterilizada e cuidadosamente removido.

Ultima revisão em: 03.2020

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Medisorb P PLUS ADHESIVE
Öntapadó, nedvszívó poliuretán kötszer

JELLEMZŐK
MEDISORB P PLUS ADHESIVE steril, habkötszer ragasztóval, mely a következő összetevőkből áll:
- hidrofil poliuretán hab – puha, rugalmas réteg, amely megfelelő nedves környezetet biztosít a sebgyógyuláshoz. Speciális "pore-in-pore" struktúrájának köszönhetően nagy a váladékfeleslég felszívó képessége.
- féig áteresztő poliuretán film – külső réteg, amely véd a sebet a külső tényezőktől.
- hipoallergén akril ragasztó – a ragasztós réteg biztosítja a sebre való rögzítést.
- szilikonozott papír – öntapadó-védő réteg, perforált a könnyebb használat érdekében.

JAVALLAT
A MEDISORB P PLUS ADHESIVE egy olyan termék, amely váladékozó sebek kezelésére alkalmas, ezen belül poszt-operatív sebek, különböző eredetű elégtelenségből eredő lábszárfekélyig, kiterjedt poszt-traumatikus sebek és felfekvések ellátására. A kötszer különösen alkalmas az elhalt szövetek és gennyes váladékok mindenféle sebből történő gyors eltávolítására.

ELLENJAVALLAT
Nem alkalmazható olyan sebekénél, ahol száraz var vagy fekete nekrózis alakult ki. A termék semmi képpen nem kombinálható kenőcsökkel, krémekkel, porokkal vagy fertőtlenítő szerekkel. Ne alkalmazza a kötszert belsőleg, testüregekben. Ne alkalmazza vérző sebek ellátására vagy vérzés csillapítására.

ALKALMAZÁS
1. Tisztítsa meg a sebet steril izotóniás sóoldattal, hogy eltávolítsa a rajta található kenőcsöt vagy száraz elhalt szövetet.
2. Gyengéden szárítsa meg a seb körül bőrfelületet.
3. Nyissa ki a csomagolást.
   Fogja meg a közvetlen (fémes papírtól készült) csomagolás ellentétes végeit és húzza szét, a kötszer teljes kitakarásáig.
4. Ügyeljen az elsődleges csomagolás fólián található megfelelően a nedvszívó oldalával fogja felhelyezni a sebre.
   A MEDISORB P PLUS ADHESIVE kötszer két felegből áll:
   - sima és fényes felület, amely külső fedőrétegként védi a sebet a külső tényezőktől,
   - hipoallergén ragasztóval ellátott ragasztós réteg, melyet egy papír-fólia bevonat takar, amit alkalmazás előtt el kell távolítani.
5. Közvetlen alkalmazás:
   Helyezze a kötszert a tenyerébe úgy, hogy a védőréteggel ellátott ragasztós felület felénk nézzen. Hajtsa meg a kötszert a perforáció mentén. Finoman húzza meg, hogy a szilikon papír elváljon a ragasztós felülettől. A belső felső sarokból kiindulva húzza le az egyik védőpapírt. Most helyezzük a kötszert el a tenyerében úgy, hogy a nem tapadó felület legyen a tenyerén és a második védő papírt is húzzuk le a belső felső sarka felől. Ne érjen az öntapadós felülethez! Helyezze a kötszert, ragasztós felével a sebre. A kisebb sérüléseknél olyan méretűre vágja a kötszert, hogy a seb szétlátó mtg. 2-3 cm szélességben fedést biztosítson a sérült felületen. Nagyobb sebek esetén használjon több kötszert, hogy lefedje azt. Győződjön meg róla, hogy a teljes váladékozó felület közvetlenül kötődésre kerüljön.
6. A kötszert naponta ellenőrizni kell:
   - Abban az esetben, ha feleslleges váladék gyűlt fel a kötszer alatt, vagy a váladék elért a kötszer szélét és szivárogni kezd, a kötszert cserélni szükséges. A kötszert eltelt eltelexitve is javasolt 1-5 naponként cserélni – a sebterek morfológiája vagy a váladékozás figyelembevételével.
   - Abban az esetben, ha gyulladás jelei mutatkoznak (vörösödés, ödéma, a sérült felület túlzott melegedése), a kötszer használatát abba kell hagyni, míg a tünetek teljesen meg nem szűnnek. A terápia a gyulladás megszűnése után folytatható.
7. A sebre való felhelyezés előtt amennyiben szükségszerű a kötszer általható antibiotikum oldattal.
8. Kis mennyiségű sebváladék esetén a kötszer kiszáradhat és hozzáragadhat a seb felszínéhez. Ilyen esetben a kötszercsere fájdalommal, vérzéssel és fájdalmal jelentkezik, ilyesa át izotóniás sóoldattal, csak ez után, óvatosan távolítsa el a kötszert.

KIEGÉSZÍTŐ TUDNIVALÓK
1. A MEDISORB P PLUS ADHESIVE steril termékként kerül forgalomba.
2. A kötszer nem igényel előzetes, izotóniás sóoldattal történő